

**【薬品構成】**

有効成分: フィナステリド 1mg

服用量: 医師の指示に従ってください。(通常1回1錠)

保管: 室温30℃以下の場所で保存してください。

【効能】

フィンペシアは男性のAGA(男性型脱毛症)を治療するための経口治療薬です。この製品はフィナステリド 1mg を含有するプロペシアのジェネリック薬品になります。フィンペシアの主な効能は男性の脱毛症を抑制させるものです。

【投与量】

フィンペシアは1日1回1錠毎日服用します。服用後3か月ほどで徐々に脱毛が改善されてきます。

※通常6か月以上の連続投与が必要。

【注意事項】

- ・円形脱毛症や皮膚疾患での脱毛または抗がん剤治療による脱毛には効果がありません。
- ・女性には適用する医薬品ではありません。万が一摂取した女性が妊娠期間中の場合胎児の生殖器官に影響が出る場合があります。
- ・服用を止めてしまうと再び脱毛が進行します。
- ・飲酒前後の服用は効果が半減するため控えてください。
- ・20歳以下の方は、フィンペシアを服用しないでください。
- ・毎日一定の時間に服用すること。

【フィンペシア服用中の献血】

フィンペシアを服用している場合献血は避けましょう。

※血中のフィナステリド成分が献血した相手(特に女性)に入らないようにする為です。

【副作用の可能性】

一部の服用者の中には副作用として、性欲減退、精液減少、肝機能障害をおこすことがあります。身体に異常が表れた場合には服用を中止し医療機関に相談すること。

【薬物相互作用】

フィンペシアには、併用禁忌薬はありません。

【過剰摂取】

1日あたり2錠以上服用しても効果は変わりません。

※服用を忘れてしまった場合でも次の日は通常通り1錠の服用にすること。

【保管方法】

湿気、日光をさけ、子供やペットの届かないところに置き、常温で保管してください。

【Drug Facts】

Active Ingredient: Finasteride 1mg per tablet

Usual Dosage: As directed by the Physician. (Take 1 tablet by mouth)

Storage: Store below 30°C

【Efficacy】

Finpecia is an oral therapeutic agent for treating male AGA (male pattern baldness). This product is generic drug of the Propecia containing 1 mg finasteride. The main efficacy of Finpecia is to suppress male alopecia.

【Common use】

Take one tab of by mouth daily, Depilation will be gradually improved in about 3 months after taking.

※Continuous administration more than 6 months will be necessary.

【Precautions】

- ・ There is no effect for depilation by alopecia areata or skin diseases or hair removal by anticancer drug treatment.
- ・ This is not a applicable drug for women. If you take this drug during pregnancy, It may affect the reproductive organs of the fetus.
- ・ If you stop taking the drug, hair removal will start again.
- ・ Taking the drug before or after drinking an alcohol, An effect will be reduced to half, so please refrain.
- ・ If you are under 20 years old please do not take Finpecia.
- ・ Take this drug a certain time every day.

【Blood donation while taking Finpecia】

Avoid blood donation when taking Finpecia.

※It is to prevent not to enter finasteride ingredients to the donated partners (especially women).

【Possible side effects】

Some of the recipients may cause libido, decreased semen and liver dysfunction as side effects. In case of abnormality in the body, please stop taking and consult with medical institutions or doctors.

【Drug interactions】

There are no incompatible drug combination with Finpecia.

【Overdose】

Even if you take more than 2 tablets per day, the effect will not be changed.

※If you forget taking the drug daily, you should take 1 tablet as usual in next day.

【St orage】

Please avoid moisture and sunlight, Keep out of the reach of children and pets, Keep in room temperature.